

Carcinidae






Teksti: Harri Jalava (Perhoswiki 2015-05-02)

Kuvat: Kuvapankki (<http://insects.fi/insectimages/browser>)

Havainnot: Hyönteistietokanta (<http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html>)

Ohjelmisto: iText (<http://itextpdf.com/>)



Tuntomerkit. Siipiväli 16-22 mm. Etusiivet vaaleanokrat, enemmän tai vähemmän puppuransävyiset, paikoin tumman harmaanruskeakehnäiset. Etureuna purppura; lähellä tyveä etureunassa keltainen laikku, toinen keskikohdan ulkopuolella. 1/4 kohdalla tumman harmaanruskea poikkijuova; sen ulkopuolella takareunassa suuri, kellertävä alue. Diskaalitäplät tummanharmaat; siipitaitetäplä tavallisesti häipyvä. Ulkoreunassa purppura juova. Siipiripset kirkaankeltaiset paitsi takakulmassa. Takasiivet kellanvalkeat, kärjestä roosansävyiset.

Elintavat. Tammi- ja lehtimetsissä, puistoissa. Lentää iltapäivällä ja illalla; tulee yöllä valolle.

Toukka vihreä, selässä 2 tai 4 valkeaa, keltaista tai kellanvihreää juovaa, jotka jatkuvat niska- ja peräkilvissä; takimmaisat hengitysaukot mustat. Pää kellanharmaa tai vartalon värinen, melko suuri ja nelikulmainen; niska- ja peräkilpi, raajat sekä nystyrät vartalon väriset. Elää tammella (*Quercus*), myös pihlajalla (*Sorbus*), orapihlajalla (*Crataegus*) ja seljalla (*Sambucus*), ohuessa, valkeahkossa kudoksessa lehden alapinnalla; talvehtii valkeassa kudoksessa oksalla. Koteloituu kotelokoppaan ravintokasville.